

Beitrag zur Kenntnis der Melolonthiden. (Col.)

Von J. Moser, Ellrich.

XIV.

Autoserica Seydeli n. sp.

♂. *A. rhodesianae* Pér. affinis, praecipue differt: femoribus posticis augustioribus. Rufo-fusca, opaca. Capite, fronte opaca, subtiliter punctata, clypeo rugoso, medio leviter convexo, margine antico sinuato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine subaequali; prothorace longitudine plus duplo latiore, lateribus setosis, postice fere rectis, antice incurvatis, angulis anticis parum acutis, fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso subtiliter punctato, punctis minutissime setosis; scutello setifero-punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, sat remote punctatis, punctis setis minimis vestitis, setis nonnullis paulo majoribus; pygidio mediocriter crebre punctato, punctis ante pygidii apicem setis erectis instructis. Subtus pectoris medio leviter sulcato et utrinque setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis setosis, setis minutis, juxta coxarum latera validis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus tibiisque posticis paulo modo dilatatis, femoribus post marginem anticum et ante marginem posticum setosis. — Long. 6,5 mm.

Congo belge: Elisabethville. Ch. Seydel leg. XI. 1923.

Autoserica Methneri n. sp.

♂. *A. ikuthanae* Brsk. affinis, differt: clypeo minus dense punctato, margine antico profundius sinuato. Rufa, opaca. Capite, fronte subtiliter punctata, medio levissime carinato, clypeo subrugoso, setis nonnullis instructo, medio convexo, margine antico elevato, medio reflexo; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace postice duplo lato quam longiore, antrōrum angustato, lateribus postice fere rectis, antice incurvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso subtiliter punctato, margine antico medio producto; elytris seriato-punctatis, interstitiis parum convexis, medio-crater densitate punctis obtectis, elytrorum lateribus setosis; pygidio subrugoso-punctato. Subtus pectoris medio deplanato, utrinque juxta medium setis vestito, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis setis instructis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis opacis, in parte basali sat

latis, ad apicem versus angustatis, antice et postice setosis, margine postico in parte apicali sinuato; tibiis posticis modice dilatatis et abbreviatis. — Long. 7 mm.

Africa or: Makonde Hochland. Methner leg. XII. 1916.

Autoserica microchaeta n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, flavo-rufa, opaca. Capite, fronte in parte anteriore sat subtiliter punctato, clypeo rugoso-punctato, antrorsum angustato, margine antico elevato, leviter sinuato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine subaequali; prothorace postice duplo latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus setosis, postice leviter sinuatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, dorso subtiliter punctato; scutello setifero-punctato; elytris leviter sulcatis, elytrorum basi breviter setosa, sulcis alternis setis paulo longioribus sparsim vestitis; pygidio umbilicato-punctato, ante apicem setoso. Subtus pectoris lateribus coxisque posticis annulato-punctatis, punctis breviter setosis, setis juxta coxarum latera validis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis opacis, paulo dilatatis, antice et postice setis nonnullis instructis, margine postico in parte apicali leviter sinuato; tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 7,5 mm.

Africa or: Karema.

Neoserica setipennis n. sp.

♂. *N. validipedi* Mos. similis, differt antennarum flabelli articulo primo in mare abbreviato, femoribus posticis minus latis. Rufo-fusca, opaca. Capite, fronte subtiliter, clypeo subrugoso-punctato, margine antico elevato, breviter sinuato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris 4-articulato, stipite paulo longiore, flabelli articulo primo caeteris fere dimidia parte breviore; prothorace transverso, lateribus ciliatis, leviter curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, dorso subtiliter punctato, punctis setis minimis instructis; elytris leviter sulcatis, mediocriter crebre punctatis, interstitiis alternis setis pallidis, seriatim positis, vestitis; pygidio sat remote punctato. Subtus pectoris medio leviter sulcato, juxta sulcum setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis setosis, setis juxta coxarum latera validis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis opacis, sat latis, antice et postice setosis; tibiis posticis fortiter dilatatis et abbreviatis. — Long. 8 mm.

Africa or: N. O. Upogoro. Methner leg.

Neoserica ciliatipennis n. sp.

♂. *N. Kilimandscharoanae* Brsk. similis, praecipue differt antennarum flabello maris longiore, tibiis posticis sat fortiter aciculato-punctatis. Rufa, opaca. Capite, fronte subtiliter punctata, antice et postice setosa, clypeo rugoso-punctato, antrorsum angustato, margine antico leviter sinuato; antennis rufo-flavis, flabello maris 4-articulato, stipite dimidia parte longiore, curvato; prothorace duplo latiore quam longiore, lateribus margineque antico setosis, illis postice leviter sinuatis, angulis anticis paulo acutis, productis, angulis posticis fere rectangulis, breviter rotundatis, dorso subtiliter punctato, setis nonnullis instructo; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, mediocriter crebre punctatis, punctis minutissime setosis, elytrorum basi densius setosa, setis paulo majoribus seriatim positis, elytrorum lateribus ciliatis; pygidio subtiliter punctato. Subtus pectore utrinque juxta medium setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis juxta pectoris coxarumque latera setosis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis opacis, sat latis, antice et postice setis vestitis, margine postico in dimidia parte apicali sinuato; tibiis posticis dilatatis et abbreviatis. — Long. 8 mm.

Africa or: Lukuledi.

Microserica panayana n. sp.

♂. *M. samaranae* Brsk. similis, antennarum flabello maris breviore, tibiis posticis paulo longioribus. Rufa, opaca, capite, prothoracis medio, elytrorum lateribus striisque nonnullis disci nigro-viridibus. Capite, fronte opaca, subtiliter punctata, clypeo fortius punctato, sparsim erecte setoso, post marginem anticum laevi; antennis 10-articulatis, flabello maris 4-articulato, stipite paulo longiore; prothorace postice dimidia parte latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus setosis, leviter curvatis, postice levissime sinuatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis paulo obtusis, dorso subtiliter punctato, punctis minutissime setosis; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, fere impunctatis; pygidio mediocriter dense punctato. Subtus pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis minutissime setosis, setis juxta coxarum latera validis; abdominis segmentis transversim setosis, femoribus posticis parum dilatatis, ante marginem posticum setis nonnullis instructis; tibiis posticis nec dilatatis nec abbreviatis. — Long. 4,5 mm.

N. W. Panay. C. F. Baker leg.

Microserica seticeps n. sp.

♂. Statura *M. pyrrhopoecilae* Brsk. Fulva, opaca, capite prothoracisque disco viridi-micantibus. Capite subrugoso-punctato, setis nonnullis sat validis vestito; antennis 10-articulatis, flabello maris 5-articulato, stipiti longitudine aequali; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus leviter curvatis, setosis, angulis anticis porrectis, acutis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso sat crebre punctato, punctis minutissime setosis, post marginem anticum setis nonnullis longioribus ornato; elytris leviter sulcatis, subtiliter punctatis, punctis setis minimis vestitis; pygidio parce punctato, ante apicem setoso. Subtus pectoris medio setis erectis instructo, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, his juxta latera setosis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis haud dilatatis, setis nonnullis ornatis, tibiis posticis nec dilatatis nec abbreviatis. — Long. 6 mm.

Sumatra.

Neuroserica usambarica n. sp.

♂. *N. fulvescenti* Blch. similis, praecipue differt clypeo antrorum minus angustato. Fulva, opaca. Capite, fronte subtiliter punctata, clypeo antrorum parum angustato, margine antico elevato, medio reflexo, angulis anticis rotundatis; antennis rufoflavis, 9-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace latiore quam longiore, antrorum parum modo angustato, lateribus setosis, post medium sinuatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis fere rectangulis, margine antico medio leviter producto, dorso subtiliter punctato; scutello oblongo, trianguli, fortius punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis, leviter convexis, fere impunctatis, elytrorum lateribus setis vestitis; pygidio subtiliter punctato, ante apicem setis validis instructo. Subtus pectoris medio leviter sulcato, utrinque juxta sulcum setoso, pectoris lateribus coxisque posticis sat grosse punctatis, coxis juxta latera setosis; femoribus posticis nitidis, setis nonnullis vestitis, perparum dilatatis, ad apicem versus angustatis; tibiis posticis gracilibus, tibiis anticis bidentatis; tarsorum antecorum articulis in mare abbreviatis et dilatatis, unguiculis anticis divergentibus, inaequalibus, lobatis. — Long. 5,5 mm.

Africa or: Usambara.

Triodonta ferruginea n. sp.

♂. *T. angusticruri* Mos. similis, femoribus posticis latioribus. Ferruginea, nitida, flavo-pilosa. Capite dense subrugoso-punctato, punctis pilosis, clypeo antrorum sat fortiter angustato, post

marginem anticum laevi, margine antico medio reflexo, angulis anticis rotundatis; antennis fulvis, 10-articulatis, flabello maris stipite breviore; prothorace paulo latiore quam longiore, lateribus leviter curvatis, angulis anticis acutis porrectis, angulis posticis paulo obtusis, dorso dense pilifero-punctato; elytris leviter costatis, confertim punctis pilosis obtectis; pygidii pilis longitudine inaequalibus. Subtus dense punctata, punctis pilis vestitis, abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis modice latis, tibiis posticis haud dilatatis, tibiis anticis tridentatis, articulis tarsorum anticum in mare abbreviatis et dilatatis, unguibus difformibus. — Long. 5,5 mm.

Africa or: Mohoro.

Triodonta flavipennis n. sp.

♂. *T. nyassanae* Brsk. similis, differt clypeo profundius sinuato, prothorace paulo latiore. Flava, nitida, flavidopilosa, capite, prothorace scutelloque fuscis. Capite rugoso-punctato, fronte setosa, clypeo antrorsum angustato, margine antico sat profunde sinuato, angulis rotundatis, post marginem anticum laevi; antennis flavis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 5 ultimis conjunctis, longitudine aequali; prothorace postice latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus ciliatis, fere rectis, postice levissime sinuatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis rectangulis, dorso dense aciculato-punctato, punctis pilis adpressis vestitis; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, crebre punctatis, punctis pilis setiformibus adpressis instructis; pygidio pilifero-punctato, trianguli, apice truncato, lateribus sinuatis. Subtus confertim pilifero-punctata; femoribus posticis basi dilatatis, ad apicem versus angustatis, tibiis anticis tridentatis, tarsis anticis maris crassis, unguibus abnormibus. — Long. 7 mm.

Africa or: Gologolo Geb., Makonde Hochland, Rowuma. Methner leg.

Triodonta signaticollis n. sp.

♂. Statura *T. sansibaricae* Brsk. Flava, nitida, flavidopilosa, prothoracis medio macula obscura ornata. Capite scabroso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico sinuato, angulis rotundatis; antennis flavis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 6 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, lateribus leviter curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, dorso, crebre pilifero-punctato, pilis adpressis; elytris indistincte seriato-punctatis, interstitiis dense punctis obtectis, punctis pilis

adpressis vestitis, interstitiis alternis parum convexis; pygidio dense pilifero-punctato. Subtus ubique confertim punctata, punctis pilosis, femoribus posticis modice dilatatis, ad apicem versus paulo angustatis, tibiis anticus tridentatis, tarsis anticus brevibus, crassis, unguibus difformibus. — Long. 4 mm.

Africa or: Nairobi bei Tanga. Methner leg. IV. 1915.

Triodonta uhana n. sp.

♂. *T. abyssinicae* Brsk. similis, differt prothorace laxius punctato. Fusca, nitida, griseo-pilosa. Capite scabroso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorum angustato, margine antico sinuato, post marginem anticum laevi; antennae rufo-flavis, 10-articulatis, flabello parvo; prothorace latiore quam longiore, lateribus postice fere rectis, levissime sinuatis, antice incurvatis, angulis anticus acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso mediocriter dense punctato, punctis pilis adpressis vestitis; scutello pilifero-punctato; elytris indistincte costatis, scabroso-punctatis, punctis pilosis; pygidio, crebre aciculato-punctato, punctis pilis instructis. Subtus ubique pilosa, femoribus posticis paulo dilatatis, ad apicem versus angustatis, tibiis posticis parum abbreviatis, tibiis anticus acute tridentatis, tarsis anticus maris fortiter dilatatis, unguibus abnormibus. — Long. 5,5 mm.

Africa or: Uha. Methner leg. XII. 1912.

Allotarsa nigriceps n. sp.

♂. Oblonga, parva, fulva, nitida, capite nigro. Capite post carinam clypealem dense punctato, ante carinam fere laevi, margine antico medio fortiter reflexo, mento longe flavo-barbato; antennae flavis, 10-articulatis, flabello maris 3-articulato, stipite breviore; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis anticus acutis, porrectis; angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso sat crebre punctato, margine antico medio leviter producto; scutello punctulato; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, mediocriter dense punctis obtectis; pygidio basi remote, ad apicem versus paulo densius punctato. Subtus pectore coxisque posticis sparsim punctatis, his juxta latera setis instructis; abdominis segmentis transversim setosis; pedibus gracilibus, tibiis anticus tridentatis, dente primo obsoleto, tarsis anticus in mare valde dilatatis. — Long. 4,5 mm.

Africa or: N. W. Usagara. Methner leg. 5. XI. 1912.

Onychoserica citrina n. sp.

♂. *O. flabellatae* Mrs. similis, differt antennarum flabello maris multo breviore. Flava, opaca. Capite punctato, clypeo

leviter rugoso, setis nonnullis instructo, clypeo antrorsum haud angustato, margine antico elevato, sinuato, angulis rotundatis; antennis 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali, levissime curvato; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus setosis, postice fere rectis, antice leviter incurvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso sat crebre punctato, punctis minutissime setosis, margine antico medio leviter producto; scutello, medio excepto, punctato; elytris leviter sulcatis, sulcis punctatis, punctis setis minimis vestitis, setis raris paulo majoribus, interstitiis anguste laevibus; pygidio mediocriter dense punctato, ante apicem setis nonnullis instructo. Subtus pectoris medio concavo, utrinque setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, juxta latera setosis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus tibiisque posticis haud dilatatis, illis ante marginem posticum setis nonnullis vestitis; tibiis anticis bidentatis. — Long. 5,5 mm.

Africa or: Iringa. Methner leg. XII. 1912.

Aulacoserica antennalis n. sp.

♂. *A. facili* Brsk. similis, differt antennarum articulis apice obliquis. Rufo-flava, nitida. Capite subrugoso-punctato, clypeo post apicem constricto, margine antico elevato, truncato; antennis 10-articulatis, rufo-flavis, flabello flavo, in mare stipite longiore; prothorace fere duplo latiore quam longiore, lateribus leviter curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso crebre punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, subrugoso-punctatis; pygidio sat dense punctis obtecto. Subtus medio sat subtiliter, juxta latera fortiter punctata, pectoris medio leviter late impresso; femoribus tibiisque posticis haud dilatatis, tibiis anticis bidentatis. — Long. 6 mm.

Africa or: Wiedhafen.

Trochalus urunguensis n. sp.

♂. *T. Kristensenii* Mos. similis, differt labro fortius dentato, tibiis anticis tridentatis. Ferrugineus, nitidus. Capite sat crebre punctato, fronte postice leviter transversim sulcata, clypeo antrorsum angustato, post marginem anticum constricto, medio longitudinaliter carinato, margine antico fortiter tridentato, post marginem anticum laevi; antennis ferrugineis, flabello maris stipite paulo longiore; prothorace duplo latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus leviter curvatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso dense punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis perparum convexis,

crebre punctis obtectis; pygidio mediocriter dense punctato. Subtus parce, medio subtiliter, ad latera versus fortius punctatus, femoribus tibiisque posticis modice dilatatis, illis post marginem anticum setis nonnullis instructis; tibiis posticis paulo abbreviatis, tibiis anticis distincte tridentatis. — Long. 7,5 mm.

Africa or: Urungu, Bez. Bismarckburg. Zencke leg.

Trochalus salaamus n. sp.

♂. *T. piceo* Fab. similis, praecipue differt tibiis anticis bidentatis. Castaneus, nitidus. Capite mediocriter crebre punctato, clypeo medio convexo, breviter longitudinaliter subcarinato, labro truncato, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace postice plus duplo latiore quam longiore antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis; dorso dense punctato; scutello punctulato; elytris indistincte seriato-punctatis, interstitiis planis, punctis, irregulariter positis, obtectis; pygidio sat remote punctato. Subtus medio fere laevis, juxta latera parce punctatus, coxis posticis ante marginem posticum setis nonnullis instructis; femoribus tibiisque posticis paulo dilatatis, tibiis anticis bidentatis. — Long. 6 mm.

Africa or: Dar es Salaam.

Pseudotrochalus seriatiipennis n. sp.

♂. *P. sericino* Mos. similis, differt clypeo post apicem fortius coarcitato. Nigro-fuscus, opacus, pedibus nitidis. Capite dense punctato, clypeo subrogoso, post marginem anticum coarcitato, margine antico elevato, truncato, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace postice fere duplo latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso sat crebre punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis fere planis, indistincte punctatis; pygidio mediocriter crebre punctis obtecto. Subtus pectoris medio laevi, pectoris lateribus coxisque posticis sparsim punctatis, abdominis segmentis juxta latera seriatis setosis; femoribus tibiisque posticis fortiter dilatatis, his etiam fortiter abbreviatis; tibiis anticis bidentatis. — Long. 7,5 mm.

Africa or: Usambara.

Pseudotrochalus piceoniger n. sp.

♂. *P. sericino* Mos. similis, clypeo antrorsum fortius angustato. Opacus, piceo-niger, prothorace sericeo, subtus fuscus, pedibus nitidis. Capite, fronte mediocriter crebre, clypeo densius

et fortius punctato, post marginem anticum paulo coarctato, margine antico elevato, truncato, angulis rotundatis; antennis ferrugineis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace postice longitudine duplo latiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso subtiliter punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis fere planis, sat remote punctis obtectis; pygidio sat sparsim, ad apicem versus paulo densius punctato. Subtus pectoris medio leviter sulcato, fere impunctato, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, his ante angulos posticos setosis; abdominis segmentis juxta latera setis instructis; femoribus tibiisque posticis fortiter dilatatis, tibiis etiam fortiter abbreviatis; tibiis anticis bidentatis. — Long. 8 mm.

Africa or: Usambara.

Pseudotrochalus validipes n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, opacus, supra nigro-fuscus, subtus fuscus, pedibus nitidis. Capite, fronte dense, clypeo subrogoso-punctato, post marginem anticum sat fortiter constricto, margine antico elevato, truncato, angulis rotundatis; antennis ferrugineis, flabello maris stipite parum breviore; prothorace postice duplo latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso subtiliter punctato; elytris seriato-striatis, interstitiis parum convexis, remote punctis obtectis; pygidiō subtiliter punctato. Subtus medio laevi, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, his juxta latera setosis; abdominis segmentis, medio excepto, transversim setosis; femoribus tibiisque posticis valde dilatatis, illis in parte posteriore setis nonnullis vestitis; tibiis posticis fortiter abbreviatis, tibiis anticis bidentatis. — Long. 10 mm.

N. W. Rhodesia.

Pseudotrochalus urunguensis n. sp.

♂. *P. bomuano* Brsk. simillimus, tibiis posticis parum brevioribus. Niger, opacus. Capite, vertice laevi excepto, sat crebre subrogoso-punctato, clypeo post apicem constricto, margine antico truncato; antennis rufo-flavis, flabello maris stipite breviore; prothorace postice duplo latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus leviter curvatis, ciliatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso subtiliter punctato, margine antico medio leviter producto; elytris seriato-punctatis, interstitiis parum convexis, sat sparsim punctis obtectis; pygidio mediocriter crebre punctato. Subtus medio sparsissime

ad latera versus paulo densius punctatus, abdominis segmentis juxta latera transversim fulvo-setosis; femoribus posticis latis, margine postico sinuato; tibiis posticis fortiter dilatatis et sat fortiter abbreviatis, tibiis anticis bidentatis. — Long. 8 mm.

Africa or: Urungu (Bez. Bismarckburg). Zencke leg.

Pseudotrochalus nigrofuscus n. sp.

♂. *P. infanti* Mos. similis, praecique differt corpore subtus opaco. Nigro-fuscus, opacus. Capite subrugoso-punctato, clypeo post apicem constricto, margine antico truncato; antennis fulvis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, antrorum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso crebre subtiliter punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis fere planis, sat remote punctis obtectis; pygidio medio criter crebre punctato. Subtus pectoris medio parce, pectoris lateribus coxisque posticis densius, punctatus coxis juxta latera setosis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus tibiisque posticis sat fortiter dilatatis, illis antice et postice setis instructis, his abbreviatis; tibiis anticis bidentatis. — Long. 6 mm,

Africa or: Urungu (Bez. Bismarckburg). Zencke leg.

Microtrochalus hexaphyllus n. sp.

M. plagigero Pér. simillimus. Flavus, opacus, capite, prothoracis parte anteriore, scutello corporeaque infra plus minusve virescentibus, elytris singulis nigro-limbatis et plaga media nigra ornatis. Capite rugoso-punctato, clypeo eadem forma ut in *plagigero*, post apicem tridentatum laevi, oculorum carinis conjunctis; antennis flavis, 9-articulatis, flabello maris 6-articulato, stipite longitudine aequali, flabello feminae 5-articulato, stipite breviore, flabelli articulo primo abbreviato; prothorace dimidia parti latiore quam longiore, lateribus curvatis, setosis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso sat crebre punctato; scutello punctulato; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, remote punctis obtectis; pygidio leviter rugoso, sat fortiter punctato. Subtus pectore parce punctato, punctis flavidо-piloso-setosis, abdominis segmentis transversim setosis; femoribus tibiisque posticis modice dilatatis, his etiam abbreviatis, illis antice et postice setosis; tibiis anticis bidentatis, dente tertio absoleto. — Long. 5 mm.

Africa or: Kirumba. — Holtz leg.

Ich stelle die Art trotz der abweichenden Fühlerbildung zur Gattung *Microtrochalus*, um die Aufstellung einer neuen Gattung zu vermeiden.

Sphaerotrochalus tristis n. sp.

♂. *S. madibirano* Mos. similis, paulo major, antennarum flabello maris paulo longiore. Niger, subnitidus. Capite post clypei carinam rugoso-punctato, ante carinam laevi, medio longitudinaliter carinato, margine antico tridentato, oculorum carinis conjunctis; antennis 9-articulatis, stipite fulvo, flabello nigrescente in mare stipite paulo breviore; prothorace duplo latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso crebre punctato; scutello sat remote punctis obtecto; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, mediocriter crebre punctis insiructis; pygidio postice laxe, ad marginem anticum versus densius punctato. Subtus pectore sparsim punctato, punctis griseo-setosis, coxis posticis umbilicato-punctatis, juxta latera setosis, abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis paulo dilatatis, antice et postice setosis, margine postico in parte apicali leviter sinuato; tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis, tibiis anticis tridentatis, dente primo parvo. — Long. 6 mm.

Africa or: Kirumba bei Muansa. Holtz leg. IV et XII. 1915.

Trochalo-serica testaceipennis n. sp.

T. festivae Brsk. similis, prothorace postice fortius angustato. Testacea, nitida, capite, prothorace scutelloque fuscis. Capite dense subrugoso-punctato, post marginemanticum laevi, constricto, margine antico medio fortiter reflexo, oculorum carinis haud conjunctis; antennis flavis, 9-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace duplo latiore quam longiore, antrorsum et retrorsum angustato, angulis anticis paulo acutis, porrectis, angulis posticis rotundatis, dorso crebre punctato, interdum linea media, antice abbreviata, laevi; scutello dense punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis parum convexis, mediocriter crebre punctis obtectis; pygidio sat remote punctato. Subtus pectore medio leviter sulcato, utrinque juxta sulcum setis nonnullis instructo, pectoris lateribus coxisque posticis laxe punctatis, coxis juxta latera setis vestitis; abdominis segmentis, medio excepto, transversim setosis; femoribus posticis antice setis nonnullis instructis, tibiis anticis tridentatis, dente primo parvo. — Long. 5 mm.

Africa or: Oldoway. Methner leg.

Camenta antennalis n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, rufo-ferruginea, nitida, flavo-pilosa. Capite annulato-punctato, punctis erecte pilosis, clypeo antrorsum parum angustato; lateribus post marginem anticum levissime breviter

sinuatis, margine antico profunde sinuato, angulis rotundatis, carina clypeali bisinuata; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris 7-articulato, stipite plus duplo longiore, curvato, stipitis articulo tertio elongato, longe spinoso; prothorace transverso, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis rotundatis, dorso sat remote punctato, punctis pilis erectis vestitis; elytris leviter rugosis, fortiter punctatis, punctis pilosis; pygidio convexo, parce punctis pilosis obtecto. Subtus medio sparsim, ad latera versus densius pilifero-punctata; tibiis anticis bidentatis, tarsis posticis articulo primo secundo paulo longiore. — Long. 9 mm.

Africa or: Uha.

Empacementa Methneri n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, castanea, nitida, crebre fulvo-pilosa. Capite, fronte rude punctata, punctis pilosis, clypeo fere laevi, carina clypeali levissime arcuata, clypei margine antico profunde sinuato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace duplo latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, rotundatis, dorso sat sparsim aciculato-punctato, punctis pilosis; scutello punctis nonnullis pilosis instructo; elytris prothorace densius punctatis, haud costatis, punctis pilis erectis vestitis; pygidio corporeque infra mediocriter crebre pilifero-punctatis; tibiis anticis bidentatis, dente apicali elongato, tarsis posticis articulo primo secundo paulo longiore. — Long. 9 mm.

Africa or: Unt. Umbo IX. 1915, Trockenwald bei Mtotohowa. Methner leg.

Empacementa sinuaticeps n. sp.

♂. *E. umbugwensi* Mos. similis, antennarum flabello maris longiore. Castanea, nitida, fulvo-pilosa. Capite, fronte clypeo que post carinam grosse subrugoso-punctatis, carina clypeali bisinuata, clypeo ante carinam laevi, margine antico profunde sinuato; antennis ferrugineis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo longiore; prothorace duplo latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis et posticis rotundatis, dorso mediocriter crebre punctato, punctis inaequalibus, punctis grossioribus pilosis; scutello punctis nonnullis setosis vestito; elytris mediocriter dense punctis obtectis, punctis erecte pilosis; pygidio sat crebre pilifero-punctato. Subtus medio sat remote, ad latera versus densius punctata, punctis pilis instructis; tibiis anticis bidentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore. — Long. 8 mm.

Africa or: Unt. Umbo. Methner leg. X. 1915.

Hybocamenta urunguensis n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, convexa, castanea, nitida. Capite post carinam clypealem sat crebre, ante carinam parce punctato, clypeo ante carinam paulo constricto, margine antico sinuato, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris 6-articulato, stipiti longitudine aequali, stipitis articulo quarto spinoso: prothorace postice duplo latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, illis breviter, his late rotundatis, dorso subtiliter punctato; scutello punctis nonnullis instructo; elytris fortius punctatis, costa suturali et utrinque 4 costis indistinctis laevibus; pygidio sat dense punctato, ante apicem setis nonnullis vestito. Subtus medio laxe, juxta latera paulo densius punctata, punctis flavopilosis; tibiis anticis bidentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 7,5 mm.

Africa or: Urungu, Bez. Bismarckburg. Zencke leg.

Schizonycha muansana n. sp.

♂. *S. spiniventri* Mos. simillima, differt abdome maris haud spinoso. Rufo-flava, nitida, capite, prothorace scutelloque obscurioribus. Capite granulosso-punctato, carina clypeali leviter curvata, clypeo rotundato; antennis 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali, leviter curvato; prothorace latiore quam longiore, paulo post medium rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat remote irregulariter punctato, punctis breviter setosis, post prothoracis marginem anticum granulatis; scutello parce punctato; elytris medio-criter crebre punctatis, punctis setis parvis vestitis; pygidio convexo, sat sparsim pilifero-punctato, pilis ante pygidii apicem longioribus, erectis. Subtus pectore coxisque posticis aciculato-punctatis, punctis albo-setosis; abdome medio laxe, ad latera versus densius setifero-punctato, abdome maris medio deplanato; tibiis anticis tridentatis, dente primo obsoleto; tarsis posticis articulo primo secundo breviore, unguiculis dente apicali breviore et angustiore. — Long. 11,5 mm.

Africa or: Muansa. Holtz leg. 17. X. 14.

Schizonycha callosicollis n. sp.

♂. *S. sansibaricae* Klb. similis, differt: supra subtilius punctata. Rufo-flava, nitida, capite, prothorace, scutello pedibusque rufis. Capite, fronte granulosa, clypeo remote irregulariter punctato, margine antico late rotundato; antennis 10-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, paulo post medium rotundato-dilatato, lateribus

leviter crenulatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat dense, sat subtiliter aciculato-punctato, punctis setis minutis instructis, post marginem anticum leviter transversim impresso, callo antebasali laevi; scutello elytrisque sat crebre punctatis, punctis setis parvis vestitis; pygidio sat dense, in parte media paulo laxis setifero-punctato. Subtus pectore confertim punctato, punctis longe pilosis, in pectoris medio setosis, abdomine medio laxe, ad latera versus dense punctis setosis obtecto; tibiis anticis bidentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo multo breviore, unguiculis dente apicali breviore. — Long. 26 mm.

Africa or: Kwakigembe. Methner leg. IV. 1911.

Schizonycha crenicollis n. sp.

♂. *S. Geilenkeuseri* Brsk. similis, paulo minor, supra laxis punctata. Rufo-flava, nitida, capite, prothorace, scutello pedibusque obscurioribus. Capite aciculato-punctato, carina clypeali medio antrorum producta, clypei margine antico leviter sinuato; antennis 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali, leviter curvato; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat remote punctato; scutello fere laevi; elytris mediocriter crebre punctatis, punctis setosis. Subtus laxe, pectoris lateribus densius, punctata, punctis setosis; tibiis anticis tridentatis, tarsorum anticum unguiculis dente apicali parum breviore, unguiculis caeteris dente apicali paulo longiore. — Long. 11 mm.

Africa or: Miotohovu. Methner leg.

Schizonycha genitalis n. sp.

♂. Oblonga, rufo-ferruginea, nitida. Capite granuloso-punctato, clypei carina sat fortiter curvata, clypei margine antico sinuato; antennis 10-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore, stipitis articulis 3—7 longe setosis; prothorace postice duplo latiore quam longiore, paulo post medium rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, ciliatis, antice et postice leviter sinuatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sparsim irregulariter punctato, post marginem anticum transversim impresso; scutello parce punctato; elytris mediocriter crebre punctatis, punctis setis minutis vestitis; pygidio umbilicato-punctato, punctis erecte setosis. Subtus dense punctata, punctis flavo-pilosus; abdomine maris medio deplanato, tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo breviore; unguiculis dentibus longitudine subaequalibus. — Long. 12 mm.

Africa or: Uzungwe Bge. Methner leg. 26. XI. 1912.

Das einzige vorliegende Exemplar, das mir gütigst überlassen

wurde, ist durch die eigentümliche Forcepsbildung ausgezeichnet. Die Parameren sind am Ende verdickt und trägt die eine hier einen langen, nach innen gerichteten Dorn, die andere nur einen stumpfen dreieckigen Ansatz.

Schizonycha puguensis n. sp.

♂. *S. Kakomae* Brsk. similis, antennarum flabello maris longiore. Rufo-flava, nitida, capite prothoraceque rufis. Capite, fronte rugoso-punctata, clypeo parce punctato, margine antico rotundato, medio leviter sinuato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis flabello maris stipiti longitudine aequali, leviter curvato, stipitis articulis 3.—5. elongatis; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, post medium rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso leviter rugoso, mediocriter crebre punctato, punctis breviter setosis, post prothoracis marginem anticum densius positis et scabrosis; scutello punctis nonnullis instructo; elytris sat crebre punctatis, punctis setis minimis vestitis; pygidio parce punctato. Subtus pectore coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis pilosis; abdomine medio sparsissime, juxta latera densius punctato, abdominis segmento ultimo convexo; tibiis anticis tridentatis, dente primo minuto; articulo primo tarsorum posticorum secundo breviore, unguiculis dente apicali breviore. — Long. 11,5 mm.

Africa or: Pugu.

Schizonycha crenulata n. sp.

♂. *S. bicolori* Klb. similis, praecipue differt: prothorace latiore, unguiculis dente apicali breviore. Fulva, nitida, capite prothoraceque rufis. Capite fortiter subrugoso-punctato, carina clypeali medio producta, clypei margine antico subsinuato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 6 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat remote irregulariter punctato; scutello punctis nonnullis instructo; elytris mediocriter crebre punctatis; pygidio parce punctato. Subtus pectore coxisque posticis flavo-pilosus, abdomine alutaceo, medio deplanato, sparsim punctato, abdominis lateribus paulo densius setifero-punctatis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo dimidia parte breviore, unguiculis dente apicali breviore et angustiore. — Long. 17 mm.

Englisch-Ost-Afrika: Nairobi.

Schizonycha ferruginea pennis n. sp.

♂. *S. bicolori* Klb. similis, differt pectore squamoso. Ferruginea, nitida, prothorace, scutello pedibusque rufis. Capite scabroso-

punctato, punctis breviter squamosis, carina frontali medio producta, clypei margine antico subrotundato; antennis fuscis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace fere duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus leviter crenulatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso mediocriter dense punctato, punctis squamis angustis vestitis; scutello punctis nonnullis instructo; elytris leviter rugosis, sat crebre punctatis, punctis breviter squamosis; pygidio squamifero-punctato. Subtus pectoris medio parce, pectoris lateribus densius squamulatis, abdominis medio deplanato, sparsissime punctis setosis instructo, abdominis lateribus densius punctatis, punctis squamis angustis vestitis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo breviore, unguiculis dente apicali longiore. — Long. 14 mm.

Africa or: Tanga.

Schizonycha sinuaticeps n. sp.

♂. *S. duplicatae* Klb. similis, praecipue differt: clypeo profundius sinuato, unguiculis dente apicali breviore. Rufa, nitida, elytris fulvis. Capite irregulariter scabroso-punctato, verticis frontisque carinis medio paulo antrorum productis, clypeo fortiter punctato, margine antico elevato, leviter sinuato, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus leviter crenulatis, angulis anticis et posticis obtusis, illis subrotundatis, dorso postice mediocriter crebre punctato, plaga media et utrinque plaga indistincta laevibus, dorsi parte anteriore scabroso-punctata, utrinque impressa, punctis omnibus breviter setosis; scutello punctis nonnullis setosis instructo; elytris pygidioque leviter rugosis, sat crebre punctatis, punctis setis squamiformibus vestitis. Subtus pectore coxisque posticis flavidо-pilosus, abdomine medio sparsim, ad latera versus densius pilifero-punctato; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo parum breviore, unguiculis dente anteapicali paulo longiore. — Long. 16 mm.

Africa or: Karema.

Schizonycha squamulifera n. sp.

♂. *S. nyukanae* Klb. similis, antennarum flabello maris breviore. Ferruginea, nitida, albo-squamosa. Capite scabroso-punctato, punctis albo-setosis, carina frontali arcuata, clypeo antrorum angustato, margine antico sinuato, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 5 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace longitudine

duplo latiore, post medium rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat dense sed irregulariter punctato, punctis squamis angustis vestitis; scutello punctis nonnullis squamosis instructo; elytris mediocriter crenulatis, punctorum squamis lanceolatis; pygidio umbilicato-punctato, punctis squamoso-setosis. Subtus medio sparsim, juxta latera sat dense squamifero-punctata, abdome maris convexo; tibiis anticis bidentatis, tarsis posticis articulo primo secundo breviore, unguiculis dente apicali breviore et angustiore. — Long. 11 mm.

Africa or: Tanga.

Schizonycha kirumba n. sp.

♂. Statura *S. humilis* Pér., differt prothorace breviore. Rufo-flava, nitida, capite, prothorace scutelloque obscurioribus. Capite granulato-punctato, carina clypeali medio paulo producta, clypeo margine antico subsinuato; antennis 9-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat crenulato punctato, post marginem anticum transversim impresso; scutello parce punctulato; elytris sat dense punctatis, punctis minutissime setosis; pygidio sat remote umbilicato-punctato. Subtus medio parce, ad latera versus densius punctata, punctis setosis; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo dimidia parte breviore; unguiculis dente apicali paulo breviore et angustiore. — Long. 13 mm.

Africa or: Kirumba bei Muansa. Holtz leg. 13. XI. 1914.

Chiloschiza n. gen.

Gen. *Schizonychae* affinis, differt: vertice hanc carinato, labro subtus prolongato, profunde emarginato, clypeo producto. Antennae 9-articulatae, stipitis articulo tertio elongato; tibiae anticae bidentatae, unguiculi fissi. —

Die Gattung steht durch die senkrecht herabgezogene, tief ausgeschnittene Oberlippe der Gattung *Syngenechiza* Brsk. nahe, unterscheidet sich aber von ihr durch den in der Mitte vorgezogenen Clypeus und die zweizähnigen Vorderschienen.

Chiloschiza clypealis n. sp.

♂. Oblonga, flava, nitida. Capite, fronte postice sat dense, antice parce fortiter punctata, carina clypeali breviter curvata, clypeo sparsim punctato, margine antico rotundato, medio producto; antennis 9-articulatis, stipitis articulo tertio articulis quarto quintoque conjunctis, longitudine aequali, flabello maris

articulis 4 praecedentibus conjunctis haud longiore; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso mediocriter crebre punctato, post marginem anticum leviter transversim impresso; scutello juxta latera punctis nonnullis instructo; elytris pygidioque sat dense punctatis, elytris haud costatis, pygidio convexo. Subtus parce punctata, pedibus gracilibus, femoribus posticis ante marginem posticum setosis, tibiis anticis bidentatis, dente primo parvo, dente apicali elongato; tarsis posticis articulo primo secundo breviore, unguiculis apice fissis, dente apicali longiore. — Long. 9 mm.

Africa or: Khutu. Methner leg. II. 1910.

Lepidiota Corporaali n. sp.

Ex affinitate *L. nigricollis* Kirsch. Fusca vel nigro-fusca, capite prothoraceque nigris, pedibus rufis. Capite, fronte sat remote, clypeo paulo densius punctato, clypei margine antico leviter sinuato; antennis rufis, 10-articulatis, flabello in utroque sexu parvo; prothorace medio plus duplo latiore quam longiore, lateribus curvatis, reflexis, crenulatis, angulis anticis et posticis obtusis, margine postico, medio excepto, carinato, dorso sparsim irregulariter punctato; scutello, elytris pygidioque mediocriter crebre punctatis, alutaceis, elytris ecostatis. Pectore coxisque posticis, cinereo-pilosus, abdomine parce, ad latera versus paulo densius punctato, punctis setosis, articulo primo tarsorum posticorum secundo paulo longiore, unguibus dente medio armatis. — Long. 24 mm.

Holl. Neu-Guinea.

Die Art ist der *L. rugifrons* Mos. sehr ähnlich, von der sie sich durch die weitläufige Punktierung von Stirn und Halsschild sowie durch die breiten aufgebogenen Ränder des Halsschildes unterscheidet. Da mir *L. nigricollis* Kirsch nicht vorliegt, kann ich die Art nicht mit dieser vergleichen, doch ist die Forcepsbildung eine andere, wie sie Herr Prof. Dr. Heller in Nova Guinea 1914, tab. XIV., fig. 19 gibt.

Lachnosterna microchaeta n. sp.

♂. Ex affinitate *L. rorulenta* Burm. Supra nigro-fusca, pruinosa, subtus rufo-fusca. Capite subrogoso-punctato, clypeo antrorsum angustato, margine antico sinuato, angulis rotundatis; antennarum flabello ovato; prothorace duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso mediocriter dense punctato, juxta latera subrogoso; scutello parce punctato; elytris sat dense punc-

tatis, punctis minutissime setosis, punctis nonnullis juxta suturam setis validioribus instructis; pygidio irregulariter punctato, pygidii margine longe erecte ciliato. Subtus pectore dense cinereo-villoso, abdome convexo, medio nitido, sparsim punctato, juxta latera opaco, densius punctis breviter pilosis instructo; tibiis posticis calcare inferiore infixo, unguibus dente submediano armatis. — Long. 20 mm.

Mexico (Cordoba). W. Gehlsen leg. V. 1912.

Lachnostenra parvicornis n. sp.

♂. *L. parviseti* Bates similis, differt calcaribus posticis liberis. Rufo-testacea, subopaca, capite, prothorace scutelloque obscurioribus. Capite subrugoso-punctato, clypei margine antico leviter sinuato, angulis rotundatis; antennis rufis, 10-articulatis, flabello maris parvo, ovato; prothorace duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso parce punctato; scutello laevi; elytris mediocriter crebre punctatis, punctis setis minutis instructis, setis nonnullis juxta elytrorum suturam longioribus, costis indistinctis; pygidio sparsim umbilicato-punctato. Subtus pectore flavido-villoso, abdome convexo, medio parce, ad latera versus densius punctato, punctis breviter pilosis, abdominis segmento penultimo macula parva media granulata ornato, tarsis posticis articulo primo secundo breviore, unguibus dente medio sat valido armatis, basi paulo dilatata. — Long. 20 mm.

Guateinala: Coyoenango. Riedel leg. V. 1902.

Lachnostenra subrugosa n. sp.

♂. Ex affinitate *L. rugulosae* Blch., clypeo antrorum fortius angustato, antennarum flabello maris paulo longiore. Picea, nitida. Capite sat dense subrugoso-punctato, clypeo antrorum angustato, margine antico medio exciso, angulis rotundatis; antennis rufis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 6 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus subcrenulatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso mediocriter crebre irregulariter punctato; scutello, medio excepto, punctulato; elytris rugoso-punctatis, punctis setis minutis vestitis, costis indistinctis; pygidio irregulariter rugoso-punctato, punctis minutissime setosis. Subtus pectore flavido-villoso, abdome maris convexo, medio laevi, juxta latera sat remote punctato, segmento penultimo in parte media aciculato-punctato, punctis setis minutis instructis, segmento ultimo medio leviter impresso; calcaribus posticis angustis, liberis, articulis duobus primis tarsorum posticorum longitudine aequali-

bus, unguibus dente medio, parum modo ad basim dilatatum versus inclinato, armatis. — Long. 15 mm.

Mexico: Sierra Madre de Durango.

Lachnostenra rufipes n. sp.

♂. *L. pruinipenni* Mos. similis, differt clypeo longiore, antennarum flabello breviore, prothorace haud piloso. Supra picea, pruinosa, capite prothoraceque rufescensibus, subtus rufa, nitida, abdominis lateribus piceis, pruinosus. Capite subrugoso-punctato, punctis in frontis parte posteriore setosis, clypei margine antico reflexo, leviter sinuato, angulis rotundatis; antennis rufis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 6 praecedentibus conjunctis longitudine aequali; prothorace duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso parce punctato; scutello fere laevi; elytris sat remote punctatis, costis leviter elevatis, pygidio rufo, dense punctato. Subtus pectore dense flavo-piloso, abdomine medio sparsissime, juxta latera densius punctato, abdōmine maris medio concavo, segmento penultimo medio macula granulata instructo, segmento ultimo, transversim impresso; calcaribus posticis liberis, articulo primo tarsorum posticorum secundo breviore, unguibus dente medio, ad basim dilatatum versus paulo inclinato, armatis. — Long. 22 mm.

Ecuador (Santa Inéz). R. Haensch leg.

Lachnostenra pastassana n. sp.

♂. *L. orosinae* Mos. valde affinis, praecipue differt fronte minus convexa. Castanea, nitida. Capite irregulariter punctato, medio ante et post suturam laevi, clypeo antrorsum parum modo angustato, margine antico reflexo, leviter sinuato, angulis rotundatis; antennis 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, ciliatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat remote punctato; scutello juxta latera punctis nonnullis minutis instructo; elytris leviter rugosis, mediocriter crebre punctatis, costis paulo elevatis; pygidio umbilicato-punctato. Subtus pectore flavido-villoso, abdomine maris medio canaliculato, utrinque juxta medium verrucoso, segmento ultimo sat longo, transversim impresso; calcaribus posticis liberis; articulo primo tarsorum posticorum secundo breviore; unguibus basi dilatatis, dente medio parvo armatis, unguibus mediis in mare fortiter curvatis et dente medio lato instructis. — Long. 19 mm.

Ecuador (Rio Pastassa). Feyers leg.

Lachnostenmaaosana n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, rufo-flava, nitida, flavidio-pilosa, capite, prothorace scutelloque obscurioribus. Capite fortiter punctato, fronte subrugosa, punctis erecte pilosis; antennis 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace fere duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus leviter crenulatis, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat grosse punctato, punctis pilis erectis vestitis; scutello punctis pilosis parce obtecto; elytris subrugoso-punctatis, punctis breviter pilosis, costis indistinctis; pygidio pilifero-punctato. Subtus pectore flavo-villoso, abdome medio dense, ad latera versus parcus punctato, punctis breviter pilosis; tarsis posticis articulo primo secundo longiore, unguibus dente medio armatis. — Long. 14 mm.

Amazonasgebiet: Manaos. Dr. F. Ohns leg. IV. 1900.

Harpodactyla lutea n. sp.

♂. *H. pilosae* Mos. similis et affinis, paulo minor, clypeo aliter formato. Lutea, nitida, griseo-pilosa. Capite granulosopunctato, punctis setosis, clypeo antrosum angustato, margine antico elevato, truncato, angulis anticis rotundatis; antennis 9-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis obtusis, angulis posticis fere rectangulis, dorso sat remote punctato, punctis griseo-pilosis; scutello parce pilifero-punctato; elytris laxe subrugoso-punctatis, punctis pilis griseis subrecumbentibus vestitis, pilis erectis intermixtis; pygidio convexo, pilifero-punctato. Subtus sat remote griseo-pilosa, tibiis anticis maris bidentatis, tarsis intermediis articulo basali apice intus dente recurvo armato. — Long. 5,5 mm.

Brasilia: Jatahy.

Aulanota n. gen.

Gen. *Anoplosiago* Blch. similis et affinis. Clypeus antrosum angustatus, lateribus medio leviter sinuatis, margine antico reflexo, subsinuato, angulis anticis rotundatis; antennae 8-articulatae, stipitis articulo tertio incrassato, flabello 3-articulato; prothorax transversum, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis; scutellum cordiforme; elytra post medium paulo ampliata, sulcata; pygidium triangulare, apice rotundato; tibiae anticae tridentatae; tarsi postici articulo primo elongato, unguiculi apice profunde fissi.

Aulanota sulcipennis n. sp.

♂. Nigra, nitida. Capite subrugoso-punctato, antennis rufis, flabello maris stipite breviore; prothorace dimidia parte latiore

quam longiore, medio rotundato-dilatato, lateribus crenulatis, setosis, dorso laxe irregulariter punctato; scutello, apice excepto, punctato; elytris leviter sulcatis, sulcis punctatis, interstitiis laevibus; pygidio corporeque infra dense umbilicato-punctatis, punctis flavidoo-setosis; tibiis anticis tridentatis, tibiis posticis apice uno calcari fixo armatis; articulo primo tarsorum posticorum secundo duplo longiore, unguibus apice fissis, dente apicali paulo longiore. — Long. 18 mm.

Brasilia: Petropolis. Dr. F. Ohaus leg. 23. I. 1899.

Blepharotoma petropolitana n. sp.

♂. Statura *B. tarsalis* Blch., paulo major. Fusca, nitida, elytris nigro-fuscis, ubique dense aciculato-punctata, punctis flavidoo-pilosus. Clypeo antrorum angustato, margine antico reflexo, late rotundato, clypei medio bulboso; antennis fulvis, 8-articulatis, flabello parvo, ovato; prothorace latiore quam longiore, antrorum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis rotundatis; elytris indistincte costatis; pygidio ante apicem longius piloso; margine externo tibiarum anticarum incisis duobus instructo; tarsis anticis et mediis incrassatis, unguibus profunde fissis. — Long. 9 mm.

Rio de Janeiro: Petropolis. Dr. F. Ohaus leg. 28. XII. 1904.

Philoclaenia cordobiana n. sp.

♂. *P. aeneorufae* Mos. similis, major, unguiculis dente apicali longiore. Fusca, nitida, griseo-setosa. Capite rugoso-punctato, punctis pilosis, clypeo rotundato, lateribus leviter sinuatis; antennis 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso dense punctato, punctis pilis suberectis vestitis; scutello crebre pilifero-punctato, elytris juxta saturam paulo deplanatis, dense subrugoso-punctatis, punctis breviter setosis, setis fere adpressis, setis nonnullis, praecipue in elytrorum parte basali, longioribus, erectis; pygidio confertim rugoso-punctato, punctis setas ferentibus. Subtus dense flavidoo-pilosa, tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo paulo longiore, unguibus dente apicali longiore. — Long. 15 mm.

Argentina: Cordoba.

Philoclaenia nigrita n. sp.

♂. Statura *P. flavigornis* Burm. Nigra, nitida. Capite scabroso-punctato, punctis griseo-setosis, clypeo rotundato, antennis fuscis, 10-articulatis, flabello maris articulis 6 praecedentibus

conunctis longitudine aequali; prothorace convexo, latiore quam longiore, lateribus rotundatis, setosis, angulis anticis et posticis obtusis, disco mediocriter crebre punctato; scutello fere laevi; elytris sulcatis, sulcis dense punctatis, interstitiis sublaevisibus, punctis numerosis, praecipue juxta elytrorum latera, griseo-setosis; pygidio crebre setifero-punctato. Subtus ubique sat dense punctata, punctis setis griseis vestitis; tibiis anticis tridentatis, tibiis posticis ad apicem versus dilatatis, tarsis posticis articulis duobus primis longitudine aequalibus. — Long. 7 mm.

Brasilia. Von Herrn Dr. Ohaus erhalten.

Philoclaenia sparsesetosa n. sp.

♂. *P. viridimicanti* Mos. similis, minor, antennarum flabello maris longiore. Fusca, opaca, viridi-micans, supra sparsim griseo-setosa, setis adpressis. Capite, fronte margine postico setosa, clypeo fortiter punctato, margine antico late rotundato; antennis fuscis, 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace transverso, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso parce inaequaliter setifero-punctato; scutello sparsim punctato; elytris indistincte costatis, sat remote setis adpressis instructis; pygidio sat crebre annulato-punctato, punctis setosis. Subtus ubique piloso-setosa, tibiis anticis bidentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo-duplo longiore. — Long. 7 mm.

Guayana: Maroni.

Philoclaenia griseosetosa n. sp.

Statura *P. virescentis* Blch. Oblongo-ovalis, fusca vel nigro-fusca, supra setis griseis adpressis vestita. Capite subrugoso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico reflexo, leviter sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipitis articulis 6 praecedentibus conjunctis longitudine aequali, flabello feminae paulo breviore; prothorace latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis anticis paulo obtusis, feré rectangulis angulis posticis rotundatis, dorso sat remote punctato, punctis setis adpressis vestitis; scutello setifero-punctato; elytris singulis tricostatis. subrugoso-punctatis, punctis setas ferentibus; pygidio setifero-punctato, ante apicem erecte piloso. Subtus ubique pilis griseis setiformibus vestita, tibiis anticis bidentatis, tarsis pilosis, tarsis posticis articulo primo secundo duplo longiore. — Long. 8 mm.

Columbia or: Sosomoco.

Philochlaenia lojana n. sp.

♂. Oblonga, rufa, nitida, griseo-pilosa. Capite scabroso-punctato, punctis pilosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico truncato, angulis rotundatis; antennis 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali, stipitis articulis 3—6 elongatis; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis anticis et posticis obtusis, his indistincte rotundatis, dorso dense subtiliter punctato, punctis breviter pilosis; scutello crebre pilifero-punctato; elytris singulis 4-costatis, dense subrugoso-punctatis, punctis pilis brevibus adpressis vestitis; pygidio umbilicato-punctato, punctis pilosis. Subtus crebre pilifero-punctata, pectoris pilis longioribus; tibiis anticis tridentatis, tarsis gracilibus, articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 13 mm.

Ecuador: Loja. E. Witt leg.

Philochlaenia densevestita n. sp.

♂. Ex affinitate *P. tomentosae* Brm., multo minor. Brevis, ovalis, fusca, nitida, supra et subtus dense subrugoso-punctata, punctis pilis setiformibus adpressis griseis vestitis. Clypeo antrorsum angustato, margine antico leviter sinuato, angulis rotundatis; antennis 10-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace medio duplo latiore quam longiore, antrorsum et retrorsum angustato, lateribus fortiter rotundatis, angulis anticis et posticis obtusis; elytris leviter costatis, pilis nonnullis in elytrorum parte posteriore longioribus, erectis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore, unguibus apice fissis, dente apicali breviore et angustiore. — Long. 9 mm.

Brasilia. Von Herrn Dr. Ohaus erhalten.

Philochlaenia Wittii n. sp.

♂. *P. Ohausianae* Mos. similis, supra et subtus laxius punctata. Capite irregulariter punctato, frontis margine postico setoso, clypeo antrorsum angustato, margine antico sinuato, angulis rotundatis; antennis fuscis 10-articulatis, flabello maris stipite paulo breviore; prothorace medio duplo latiore quam longiore, antrorsum et retrorsum angustato, lateribus subcrenulatis, ciliatis, angulis anticis rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso medio laxe, ad latera versus paulo densius punctato, sparsim erecte piloso; scutello subtiliter punctato, postice laevi; elytris subrugoso-punctatis, punctis breviter setosis, costis paulo elevatis, maculis setosis ornatis, callo apicali transversim setoso; pygidio medio-criteriter crebre punctato, punctis pilosis, macula media postbasali laevi. Subtus pectore longe et dense flavo-villoso, abdomine medio

laxe, juxta latera densius pilifero-punctato; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore. — Long. 17 mm.

Ecuador: Loja. C. Witt leg.

Philoclaenia archidonensis n. sp.

♂. Ex affinitate *P. aeruginosae* Brm., minor. Rufo-fusca, nitida. Capite irregulariter sāt fortiter punctato, punctis in frontis parte posteriore setosis, clypei margine antico profunde sinuato; antennis rufo-flavis 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine subaequali; prothorace duplo latiore quam longiore medio rotundato-dilatato, lateribus setosis, angulis anticis et posticis obtusis, his rotundatis, dorso aeneo-micante, irregulariter punctato, punctis setosis; scutello juxta latera punctato; elytris leviter rugosis, singulis indistincte 4-costatis, maculis numerosis, flavidopilosus, ornatis, pilis adpressis, callo apicali flavidо-setoso; pygidio umbilicato-punctato, punctis setis minutis vestitis, setis ante pygidii apicem longioribus. Corpore infra dense pilifero-punctato, tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo longiore. — Long. 12 mm.

Ecuador: Archidona. O. v. Buchwald leg.

Philoclaenia antennalis n. sp.

♂. Oblonga, fusca, griseo-pilosa. Capite granuloso-punctato, punctis pilosis, clypeo margine antico profunde exciso, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine aequali, stipitis articulo quinto fortiter elongato et paulo dilatato; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis obtusis, angulis posticis rotundatis, dorso crebre punctato, punctis pilis adpressis vestitis; scutello dense pilifero-punctato; elytris subrugoso-punctatis, punctis pilosis, pilis adpressis, pilis nonnullis setiformibus erectis seriatim positis; pygidio pilifero-punctato. Subtus dense pilosa, tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum elongato. — Long. 8 mm.

Brasilia: Novo Friburgo. 5. XII. 1898.

Philoclaenia cinereopilosa n. sp.

♂. *P. tijucanae* Mos. similis, clypeo minus profunde emarginato. Fusca, pilis griseis adpressis dense vestita. Clypeo antrorsum angustato, margine antico sinuato, angulis rotundatis; antennis 9-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali; prothorace duplo latiore quam longiore, medio rotundato-dilatato,

angulis anticis paulo acutis, fere rectangulis, angulis posticis rotundatis, dorso medio leviter longitudinaliter sulcato; elytris leviter sulcatis, costis maculis parvis indistinctis glabris instructis; tibiis anticis tridentatis, tarsis posticis articulo primo secundo parum longiore. — Long. 9 mm.

Brasilia: St. Catharina.

Corminus rufofuscus n. sp.

♂. *C. brasiliensi* Mos. similis, differt prothorace laxius et fortius punctato. Rufo-fuscus, nitidus, griseo-setosus. Capite subrugoso-punctato, punctis setosis, clypeo antrorsum angustato, margine antico reflexo, subsinuato, angulis rotundatis; antennis 10-articulatis, stipitis articulis 3.—6. elongatis, flabello stipiti longitudine aequali; prothorace paulo post medium duplo latiore quam longiore, antrorsum et retrorsum angustato, angulis anticis et posticis obtusis, dorso sat crebre punctato, punctis setis recumbentibus vestitis; scutello dense setifero-punctato; elytris aciculato-punctatis, punctis setosis, setis adpressis, setis nonnullis, praecipue juxta elytrorum suturam, erectis; pygidio umbilicato-punctato, punctis setis instructis. Subtus dense setifero-punctatus, tibiis anticis bidentatis, unguibus dente apicali angustiore et breviore. — Long. 10 mm.

Brasilia: Espirito Santo. Dr. F. Ohaus leg. 3. XII. 1898.

Heteronyx magnus n. sp.

Oblongus, parallelus, castaneus, nitidus, capite prothoraceque obscurioribus. Capite sat dense punctato, clypeo antrorsum angustato, margine antico leviter sinuato, in parte medio haud elevato; antennis flavis, 9-articulatis; prothorace lato, antrorsum angustato, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, rotundatis, dorso sat sparsim punctato; scutello fere laevi; elytris remote punctatis, indistincte costatis, lateribus setosis; pygidio in parte media sparsissime, juxta latera parce punctato, in parte posteriore setis nonnullis vestito. Subtus medio remote, ad latera versus sat dense punctatus, abdominis segmentis juxta latera transversim setosis; femoribus posticis angustis, antice et postice setosis; tibiis anticis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo breviore, unguiculis appendiculatis. — Long. 17 mm.

Holl. Neu-Guinea.

Eine große längliche Art, bei der der Vorderrand des Clypeus in der Mitte nicht gerandet ist, so daß die Oberlippe sichtbar wird.

Heteronyx castaneocens n. sp.

H. ciliato Mos. similis, praecipue differt prothoracis basi juxta angulos posticos haud sinuata. Castanea, nitida. Capite fortiter subrugoso-punctato, fronte setis nonnullis vestita, clypeo margine antico late rotundato, vix subsinuato; antennis flavis, 9-articulatis; prothorace postice dimidia parte latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso mediocriter crebre punctato; scutello punctulato; elytris sat remote punctatis, punctis raris setosis, margine laterali ciliato; pygidio parce punctato, ante apicem setis nonnullis instructo. Subtus pectore medio laxe, juxta latera densius punctato, punctis setosis; abdominis segmentis transversim setosis; tibiis anticis tridentatis, articulis duobus primis tarsorum posticorum longitudine aequalibus, unguiculis appendiculatis. — Long. 7 mm.

Holl. Neu-Guinea.

Die Art ist dem *H. ciliatus* Mos. sehr ähnlich, doch fehlt ihr der bogenförmige Ausschnitt des Halsschildes neben den Hinterecken.

Paraheteronyx n. g.

Gen. *Heteronyx* affinis, differt: antennarum flabello in utroque sexu 4-articulato, tibiis anticis bidentatis.

Paraheteronyx quadriflabellatus n. sp.

Oblongo-ovalis, niger, nitidus, pedibus rufis. Capite dense punctato, clypei margine antico subsinuato; antennis fulvis, 8-articulatis, flabello 4-articulato, in mare stipite paulo longiore, in ♀ breviore, flabelli articulo primo feminae abbreviato; prothorace duplo latiore quam longiore, lateribus curvatis, angulis anticis productis, angulis posticis rotundatis, dorso crebre punctato; scutello laevi; elytris sat fortiter punctatis, indistincte costatis, costis angustis, laevibus; pygidio grosse punctato. Subtus pectoris medio fere laevi excepto, punctatus, abdominis segmentis duobus ultimis setosis; pedibus gracilibus, tibiis anticis bidentatis, articulo primo tarsorum posticorum secundo longiore, unguiculis appendiculatis. — Long. 7 mm.

Holl. Neu-Guinea.

Pseudocongella n. gen.

Ex affinitate gen. *Lepisiae* Serv., speciebus gen. *Congellae* Pér. simillima. Caput latum, clypeus lateribus postice parallelis, margine antico subtruncato, angulis rotundatis; antennae 10-articulatae, flabello 3-articulato; prothorax transversum, paulo post medium rotundato-dilatatum, basis medio ad scutellum versus

producto; scutellum cordiforme; elytra postice paulo ampliata, indistincte costata; pygidium triangulare, apice rotundato; tibiae anticae tridentatae; unguiculi fissi.

Die Art, auf der ich diese Gattung errichte, ist der *Congella valida* Pér. sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch die Bildung des Clypeus und durch zweikrallige Hinterfüße.

Pseudocongella Methneri n. sp.

♂. Nigro-fusca, subnitida, griseo-setosa. Capite subrugoso-punctato, parce setoso, clypeo antrorsum haud angustato, margine antico elevato, truncato, levissime sinuato, angulis rotundatis; antennis ferrugineis, 10-articulatis, flabello maris 3-articulato, stipite paulo breviore; prothorace postice duplo latiore quam longiore, antrorum parum angustato, paulo post medium rotundato-dilatato, lateribus leviter crenulatis, angulis anticis rectangulis, angulis posticis obtusis, margine antico erecte setoso, basi bisinuata, dorso confertim punctato, sat remote setoso; scutello elytrisque subrugoso-punctatis, haud crebre breviter setosis, elytrorum costis indistinctis; pygidio aciculato-punctato, apice longe setoso. Subtus ubique aciculato-punctata et remote griseo-setosa, femoribus tibiisque gracilibus, tibiis anticis tridentatis; tarsis subtus flavidо-setosis, unguiculis omnibus longitudine inaequalibus, apice fissis. — Long. 10 mm.

Africa or: West-Usambara. Methner leg. I. 1916.

Hoplia sibuyana n. sp.

♂. *H. maculiferae* Mos. similis, differt unguibus posticis integris. Picea, supra dense griseo-squamosa, vittis 4 prothoracis elytrorumque maculis nonnullis nigro-fuscis, subtus margaritaceo-squamulata. Capite crebre squamoso, parce setoso, clypei margine antico elevato, subsinuato, angulis rotundatis; antennis rufo-flavis, 9-articulatis; prothorace postice dimidia parte latiore quam longiore, lateribus fortiter curvatis, angulis anticis fere rectangulis, angulis posticis obtusis, dorso dense squamoso, parce pallide setoso; scutello squamis obscuris obtecto; elytris sutura, marginibus, macula disci antemediana maculaque oblonga postmediana nigro-fuscis, setis pallidis suberectis seriatim positis; pygidio confertim griseo-squamoso, squamis, plus minusve numerosis, obscurioribus intermixtis, setis erectis remote positis. Corpore infra dense margaritaceo-squamoso, abdomine transversim setoso; tibiis anticis tridentatis; unguibus anticis et mediis apice fissis, unguibus posticis integris. — Long. 5 mm.

Philippinen: Ins. Sibuyan. C. F. Baker leg.